



© Jella und niki, Photocase.com

# Sexuell übertragbare Krankheiten (STDs)

STD	Erreger	Prävention	Symptome	Diagnose	Therapie	Mögliche Folge
<b>HIV-Infektion</b>	Viren (HIV)	Safer Sex, Kondomgebrauch	Vorübergehend können zu Beginn der Infektion grippe-ähnliche Symptome auftreten. Spezifische Symptome beim Ausbruch von AIDS.	Bluttest	Medikamente, aber keine Heilung.	AIDS
<b>Herpes genitalis</b>	Viren (HSV)	Kondomgebrauch verringert das Infektionsrisiko	Bläschen, brennende Schmerzen an den Geschlechtsstellen, manchmal Fieber.	Abstrich, Bluttest	Medikamente, aber keine Heilung.	Krankheit kann immer wieder ausbrechen.
<b>HPV-Infektion</b>	Viren (HPV)	Kondomgebrauch, Impfung gegen manche HPV-Stämme vorhanden.	Je nach HPV-Stamm Hautveränderungen, Warzenbildung oder auch symptomlos.	Abstrich	Keine Medikamente. Lokale Behandlung der Warzen	Bei gewissen HPV-Stämmen Risiko für Gebärmutterhalskrebs, Peniskarzinom, Analkarzinom
<b>Hepatitis A</b>	Viren (HAV)	Impfung	Fieber, Übelkeit, Durchfall, infektiöse Gelbsucht	Bluttest	Schonung, Diät	
<b>Hepatitis B</b>	Viren (HBV)	Impfung, Kondomgebrauch	Im akuten Stadium: Fieber, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Gelbsucht	Bluttest	Akut: Schonung, Diät Chronisch: Medikamente	Leberzirrhose, Leberversagen, Leberkrebs
<b>Syphilis (Lues)</b>	Bakterien	Kondomgebrauch verringert das Infektionsrisiko	Stadium I: schmerzloses Geschwür an den Geschlechtsstellen oder im Mund-Rachenraum Stadium II: Ausschlag, infektiöse Haut- und Schleimhautveränderungen	Abstrich, Bluttest	Antibiotika	Befall von Organen und Nervensystem
<b>Tripper (Gonorrhoe)</b>	Bakterien	Kondomgebrauch verringert das Infektionsrisiko	Ausfluss, Brennen beim Wasserlassen, mitunter Entzündung von Enddarm oder Rachenraum	Abstrich	Antibiotika	Unterleibsentzündung, Unfruchtbarkeit
<b>Chlamydien-Infektion</b>	Bakterien	Kondomgebrauch verringert das Infektionsrisiko	Ausfluss, erschwertes Wasserlassen (Jucken, Brennen) bei starkem Harndrang	Abstrich	Antibiotika	Unterleibsentzündung, Unfruchtbarkeit
<b>Lymphogranuloma vener(e)um</b>	Bakterien	Kondomgebrauch verringert das Infektionsrisiko	Hautveränderungen, starke Schwellung der Lymphknoten, Bildung von Abszessen	Abstrich	Antibiotika	Lymphstau
<b>Ulcus molle (weicher Schanker)</b>	Bakterien	Kondomgebrauch	Schmerzhafte Hautgeschwüre an den Geschlechtsorganen. Bei Frauen oft symptomlos.	Abstrich	Antibiotika	
<b>Bakterielle Vaginose</b>	Bakterien	Kondomgebrauch	Ausfluss, Schmerzen beim Wasserlassen, Scheidenentzündung. Die Bakterien können auch auf die männl. Geschlechtsorgane übertragen werden, verursachen aber meist keine Symptome	Abstrich	Antibiotika	Unfruchtbarkeit
<b>Trichomoniasis</b>	Einzeller	Kondomgebrauch verringert das Infektionsrisiko	Ausfluss, Juckreiz, starker Harndrang, Schmerzen bei Wasserlassen und Geschlechtsverkehr	Abstrich	Medikamente	Entzündung der Prostata oder der Nebenhoden
<b>Pilzinfektionen</b>	Pilze	Kondomgebrauch verringert das Infektionsrisiko	Ausfluss, Juckreiz, Brennen, Schmerzen beim Wasserlassen	Abstrich	Lokale Antipilzmittel	